© 2016 臺大醫院泌尿部、臺灣楓城泌尿學會 版權所有

# Doxaben XL® 4mg

# 可迅®持續性藥效錠 4 毫克

## 藥品概述

Doxazosin XL 主要用於治療高血壓、良性前列腺肥大。本藥主要使作用在血管壁平滑肌放鬆，減少血流通過時的阻力，治療高血壓；本藥也會使作用在膀胱及前列腺的肌肉放鬆，減少因列腺肥大產生的排尿困難

## 健保給付狀況

可迅®持續性藥效錠為健保給付用藥

## 用藥方式

1. 依醫師指示服用，並於每日一次固定時間服藥，每日最大使用劑量為 8 毫克
2. 本藥可與食物併服(飯中或飯後)。
3. 本藥為長效型藥錠，請伴隨一杯開水整粒吞服，勿撥半、磨粉或嚼碎

## 不良反應及處理方式

偶有對頭暈、頭痛、視力模糊、容易疲倦、男性性功能障礙等現象，通常服藥一段時間後，副作用就會改善，若不舒服的情況有變嚴重如呼吸困難、心跳加速或不規律、胸痛等，應主動就醫及聯絡醫生或藥師

1. 若為心、腎臟疾病的病人應主動告知醫生及藥師，可能需要調整本藥劑量
2. 建議第一次在睡前服用本藥，因為第一次服藥後，病人容易發生姿態性低血壓，從坐或躺著改變到站立的姿勢時，血壓可能突然下降而產生暈眩而跌倒，要特別留意
3. 服藥期間不可任意停藥
4. 曾對多薩坐辛類藥物、其他藥物過敏或接受手術前的病人，請主動告知醫生及藥師
5. 若為肝臟疾病的病人應主動告知醫生及藥師，可能需要調整本藥劑量。
6. 本藥應儲存在乾燥陰涼的室內且孩童不易取得的地方



本指導單張僅提供一般資訊參考，
若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

臺大醫院泌尿部、臺灣楓城泌尿學會 關心您
更多資訊：https://www.tmua.org.tw/

© 2016 臺大醫院泌尿部、臺灣楓城泌尿學會 版權所有

7. 如果沒有超過每日應服藥時間太久，應儘速服用。若已經超過數個鐘頭或是已接近下一次服藥時間，則不必再補服上一個劑量，切記不可重複服兩個劑量

Department of Urology
國立
臺灣大學醫學院
泌尿部
附設醫院
National Taiwan University Hospital



本指導單張僅提供一般資訊參考，
若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

臺大醫院泌尿部、臺灣楓城泌尿學會 關心您
更多資訊：https://www.tmua.org.tw/