

優列扶®膠囊 4 毫克

Urief® Capsules 4 mg

藥品概述

治療攝護腺肥大症所伴隨的排尿障礙。

健保給付狀況

優列扶/Urief 為健保給付用藥。

用藥方式

通常，成人以 1 日 2 次，1 次 4 毫克於早晚餐後口服投與本品，並且依病患症狀可適當減少劑量。

禁忌症、注意事項與副作用

1. 中度腎功能障礙者，有 silodosin 血中濃度上升的報告，須調整劑量
2. 嚴重肝功能障礙者（Child-Pugh score ≥ 10 ）使用本品的臨床研究未執行，因此本品禁用於嚴重肝功能障礙者。
3. 禁止與強效 CYP3A4 抑制劑（如 ketoconazole、clarithromycin、itraconazole、ritonavir）併用。
4. 手術中虹膜鬆弛症候群（Intraoperative floppy iris syndrome）在一些正服用或術前有服用 α -adrenergic receptor 阻斷劑的病患進行白內障手術時會發生。服用本品的病患應被告知，若進行白內障手術須告知其眼科醫師有服用本品的情形。


副作用：射精障礙（逆行性射精等）、口渴、下痢、軟便、起立時有頭暈、鼻塞、頭暈、搖晃感、頭痛。

第 1 頁 / 共 2 頁

本指導單張僅提供一般資訊參考，
若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

臺大醫院泌尿部、臺灣楓城泌尿學會 關心您
更多資訊：<https://www.tmua.org.tw/>





第 2 頁 / 共 2 頁

本指導單張僅提供一般資訊參考，
若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

臺大醫院泌尿部、臺灣楓城泌尿學會 關心您
更多資訊：<https://www.tmua.org.tw/>

