

柳菩林 (Leuplin) (PCD-002)

2018 年更新

藥品概述

Leuplin 中文商品名為柳菩林注射劑，為促性腺激素釋放激素 (LHRH) 之合成類似劑。長期使用可抑制腦下垂體分泌黃體形成激素 (LH)，而導致男性睪固酮 (或稱男性荷爾蒙; testosterone) 血中濃度降低。柳菩林可合併放射線治療，用於治療高惡性度攝護腺 (前列腺) 癌；或是治療轉移性攝護腺 (前列腺) 癌。

健保給付狀況

攝護腺 (前列腺) 癌使用柳菩林有健保給付。

用藥方式

成人每 4 週皮下注射 3.75 mg 柳菩林注射劑。腎衰竭或肝衰竭病人，劑量不必調整。

不良反應以及處理方式

常見的副作用有週邊肢體水腫、禿頭、熱盜汗、噁心嘔吐、骨頭痛、記憶衰退、失眠等等；嚴重的副作用包括血管栓塞、肺栓塞、心衰竭等等。若使用藥物後有嚴重副作用可與醫師討論調整藥物。

第1頁 / 共1頁

本指導單張僅提供一般資訊參考，
若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

臺大醫院泌尿部、臺灣楓城泌尿學會 關心您

更多資訊：<https://www.tmua.org.tw/>

