

輔美康 注射劑 FIRMAGON® (PCD-004)

2018 年更新

藥品概述

輔美康注射劑是一種選擇性促性腺激素釋放激素阻斷劑，它可以迅速的降低促性腺激素、黃體激素和濾泡激素的釋放，從而減少睪丸分泌睪固酮。已知前列腺癌對雄激素（如睪固酮）敏感，並對雄性激素阻斷治療有良好反應。不像促性腺激素釋放激素受體促效劑，促性腺激素釋放激素受體阻斷劑在初始治療後不會出現促黃體激素的激增而導致睪固酮激增/腫瘤進展和加重潛在的症狀。

健保給付狀況

有健保給付，健保限用於成年男性晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌患者。

用藥方式

本藥需由醫師處方使用。僅用於腹部皮下注射。注射區域應該作週期性更改，應選擇無外在壓力的區域，不適合靠近腰帶和束帶，也不應靠近肋骨。

不良反應以及處理方式

在期臨床研究中，最常見的不良反應是由於睪固酮抑制導致的生理學變化，包括潮熱和體重增加，或注射部位的副作用。如有出現注射部位的副作用，如疼痛和紅斑，可以冰敷方式緩解。



第1頁 / 共1頁

本指導單張僅提供一般資訊參考，
若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。
臺大醫院泌尿部、臺灣楓城泌尿學會 關心您
更多資訊：<https://www.tmua.org.tw/>

