

癌立佳 (Eligard) (PCD-005)

2018 年更新

藥品概述

Eligard (leuporelin acetate) 中文商品名為癌立佳。它是一種促性腺激素釋放激素作用劑 (荷爾蒙療法)，持續地投與會抑制腦下垂體分泌促性腺激素，進而抑制男性睪丸類固醇的生成，達到藥物去勢治療的效果。像其他促性腺激素釋放激素作用劑一樣，leuporelin acetate 在治療的第一週，會使血清中 testosterone 的濃度暫時性上升，臨床症狀有時會出現暫時性惡化。應於開始治療的最初數周內，密切觀察疾病症狀，給予適當處理，通常繼續治療後，這些症狀便會消失。

健保給付狀況

臺灣衛生福利部已經核准癌立佳使用於晚期前列腺癌紓解治療。健保署亦有給付用於前列腺癌之治療。

用藥方式

癌立佳是一種注射劑，需要經由醫療人員以皮下注射的方式給予病患治療。其建議的治療劑量為每三個月注射一次 (22.5 mg)。注入皮下的溶液透過一個穩定的藥品傳輸系統，可以在 3 個月內持續釋放 leuporelin acetate。ELIGARD 用於晚期攝護腺癌紓解治療必須是長期治療，當病情緩解或改善時，不該停止治療。

不良反應以及處理方式

在癌立佳的治療中較常見的不良反應有熱潮紅、身體不適、噁心、疲勞，以及注射部位短暫的局部刺激等。約有 58% 的患者發生輕度或中度熱潮紅。若在治療過程中發生任何不良反應時，請聯絡您的醫療人員。

