

## 癌骨瓦 注射液

### XGEVA (denosumab) (PCD-105)

2018 年更新

#### 藥品概述

XGEVA 適用於惡性腫瘤已有骨轉移之成人病患，預防發生骨骼相關事件。治療因為非轉移性攝護腺癌，而進行荷爾蒙治療，且具高度骨折風險之男性患者的骨質流失現象。

#### 健保給付狀況

無健保給付。

#### 用藥方式

XGEVA ( Denosumab ) 的建議劑量為是每 4 週皮下注射 1 針 120 mg XGEVA，注射於上臂、大腿或腹部。

接受 XGEVA ( Denosumab ) 治療期間，應補充鈣質與維生素 D，以治療或預防低血鈣症。

#### 服藥禁忌

#### 低血鈣症

- 在開始使用 XGEVA 治療之前，必須先矯治既有的低血鈣症
- 臨床研究顯示，嚴重腎功能受損（肌酸酐廓清率 < 30 毫升/分鐘）或正在接受透析治療的患者發生低血鈣症的風險較高。對嚴重腎功能受損或正在接受透析治療的患者投予 XGEVA 時，應權衡其效益風險概況。

#### 懷孕及授乳

- 並未針對懷孕婦女進行過 XGEVA ( Denosumab ) 的試驗。如果您已經懷孕、或認為您可能懷孕、或是計畫懷孕，請務必告知醫師。如果您懷有身孕，並不建議使用 XGEVA ( Denosumab )。

#### 過敏



- XGEVA 禁用於曾對本品之任何成份發生全身性過敏反應的患者。這些反應包括全身性過敏反應 ( anaphylaxis )、臉部腫脹與蕁麻疹。

#### 避免服用含有相同活性成份的藥品

- Prolia 含有 Xgeva 相同的活性成份 ( denosumab )。接受 XGEVA 治療的患者不可使用 Prolia。

#### 可能的副作用

##### 血中鈣濃度低 ( 低血鈣症 )

XGEVA ( Denosumab ) 可能會使血中鈣濃度降低。若您開始接受 XGEVA ( Denosumab ) 之前已有低血鈣，則治療期間可能會惡化。必須先治療低血鈣問題，才可開始使用 XGEVA ( Denosumab )。大部份低血鈣患者並沒有症狀，但有些人例外。若您有下列症狀，請立即連絡醫師：

- 肌肉痙攣、抽筋或抽搐
- 手指、腳趾或嘴巴周圍感覺麻木或刺痛

使用 XGEVA ( Denosumab ) 期間，醫師可能會開立鈣質與維生素 D 給您，以預防低血鈣。請按照醫師指示，服用鈣質與維生素 D。

##### 嚴重下顎骨問題 ( 顎骨壞死 )

使用 XGEVA ( Denosumab ) 可能會發生嚴重的下顎骨問題，如顎骨、口腔或牙齒疼痛、麻木、腫脹或流出液體。開始使用 XGEVA ( Denosumab ) 之前，醫師應為您檢查口腔。醫師可能會請您在使用 XGEVA ( Denosumab ) 之前先去牙科就醫。且在接受 XGEVA ( Denosumab ) 治療期間，必須維持良好的口腔衛生。

XGEVA ( Denosumab ) 其他常見的副作用包含：

疲倦無力、低磷酸鹽血症、噁心與呼吸困難，請告知醫師或藥師。

